

BrackFix

SISTEMA FLUORESCENTE PARA A COLAGEM DE BRACKETS

VOCO
THE DENTALISTS

BrackFix

COLAGEM SEGURA

A colagem dos brackets é um elemento de fundamental importância na ortodontia. Os diferentes materiais disponíveis no mercado prometem, além de boas propriedades físicas, um fácil manuseamento e um procedimento simples de colagem dos brackets. Para além dessas propriedades, também é imprescindível que os restos de adesivo possam ser completamente removidos das superfícies dentárias após a retirada dos brackets. Pensando nisso, a VOCO criou um sistema de colagem que se destaca não apenas pelas qualidades anteriormente mencionadas, mas também pela sua fluorescência, uma propriedade que proporciona mais facilidade e segurança na remoção dos restos de adesivo após a descolagem dos brackets.

O BrackFix é um sistema fotopolimerizável para a colagem de brackets, que se destina à fixação segura e estável de brackets metálicos ou cerâmicos. A ligação entre o bracket e o dente é suficientemente forte para suportar as cargas que incidem a todo o momento, mas, por outro lado, ainda permite descolar os brackets com facilidade, sem danos às superfícies dentárias. O BrackFix é composto por um adesivo e um primer. Este último está disponível nas versões "condicionamento ácido total" e "autocondicionante".

A escolha é sua
Para a preparação das superfícies dentárias antes da colagem dos brackets, pode escolher um dos dois seguintes tipos de primer:

BrackFix Primer
O BrackFix Primer, fornecido num frasco laminado, destina-se à técnica de "ondicionamento ácido total", isto é, a superfície dentária precisa de ser condicionada com ácido fosfórico antes de receber a colagem do bracket.

BrackFix Primer SE
Se, antes de colar os brackets, preferir não condicionar as superfícies dentárias, terá a opção de utilizar o BrackFix Primer SE, uma versão "autocondicionante" do produto fornecida na prática *SingleDose*.

Manuseamento
O componente adesivo do sistema é fornecido numa seringa que permite aplicar a quantidade ideal de adesivo ao bracket. A viscosidade foi escolhida de tal forma que os brackets possam ser posicionados com precisão na superfície dentária e não se desloquem dessa posição.

O adesivo não escorre antes da fotopolimerização final, o que proporciona mais tranquilidade e segurança ao profissional durante o trabalho.

Fotopolimerizável
O BrackFix é um sistema fotopolimerizável para a colagem de brackets. Num primeiro passo, os brackets podem ser posicionados com precisão em todos os dentes de uma arcada. Em seguida, a fotopolimerização é que definirá o início do endurecimento do material. Outra vantagem da fotopolimerização é que, após a mesma, o arco ortodôntico pode ser colocado imediatamente aos brackets.

BrackFix

REMOÇÃO CONTROLADA DO ADESIVO FLUORESCENTE

Fluorescente

O adesivo contém um corante que, sob a luz UVA (365 nm +/- 5 nm), apresenta uma fluorescência azul. Dessa forma, é possível tornar visíveis os restos do adesivo BrackFix, que podem então ser removidos cuidadosamente, sem danos ao esmalte. O profissional adquire mais segurança e pode ter a certeza de ter removido todos os restos de adesivo, um importante requisito para a minimização do risco de pigmentações dentárias ou cáries.

Caso clínico

Limpeza dentária

Condicionamento ácido das superfícies de esmalte

Aplicação do BrackFix Primer

Fácil aplicação do BrackFix adesivo ao bracket

Posicionamento fácil e estável do bracket no dente

Dente 11 antes da polimerização e da remoção de excessos


Sob a luz UVA (apenas para demonstração)


Iluminação com luz UVA após a remoção dos brackets

Remoção controlada dos restos de BrackFix

Resultado após a descolagem dos brackets e a remoção dos restos de adesivo

Controle final com o auxílio da luz UVA: nenhum resto de adesivo nos dentes

Fonte: Dr. Felipe Moura / Brasil

BrackFix

SISTEMA FLUORESCENTE PARA A COLAGEM DE BRACKETS

Indicações

Colagem direta de brackets ortodônticos metálicos e cerâmicos

Vantagens

- Consistência ideal do adesivo: posicionamento estável do bracket no dente
- Fixação segura de brackets metálicos e cerâmicos
- Fotopolimerizável: tempo de trabalho longo
- Pode ser submetido a carga imediatamente após a polimerização
- Fluorescente: os restos de adesivo podem ser removidos rapidamente, sem lesar os dentes, após a retirada dos brackets

Apresentação

REF 1205	Kit adesivo seringa 2 × 4 g, Primer frasco 6 ml, acessórios
REF 1206	Kit SE adesivo seringa 2 × 4 g, Primer SE *SingleDose* 40 un., acessórios
REF 1207	Adesivo seringa 2 × 4 g
REF 1208	Primer frasco 6 ml
REF 1209	Primer SE *SingleDose* 50 un., acessórios
REF 2247	Single Tim, pincéis de aplicação, 100 un.
REF 2315	Paletes de mistura, 20 un.

VOCO do Brasil Ltda
Av. Severo Dullius, 195/101A
Porto Alegre - RS
CEP: 90200-310

Tel.: (51) 3337-5153
Fax: (51) 3337-8486

info@voco.com.br
www.voco.dental

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com
www.voco.dental

Distribuidor:

VOCO
THE DENTALISTS