VOCO Profluorid L

USA | EN **Instructions for use**

Carefully read instructions prior to use

Fluoride varnish for the treatment of hypersensitivity

Profluorid L is a fast-drying dental suspension that adheres well to dry enamel and dentin. Thus, achieving a tight seal of the dentin tubules for an extended period of time is possible. **Profluorid L** forms a waterproof, insulating protective coat against thermal and chemical influences.

Indications:
- Treatment of hypersensitive teeth.
- Sealing of the dentinal tubules for cavity preparations or on sensitive root surfaces.
- Cavity liner under amalgam restorations
- Desensitizer before and after bleaching

Contraindications:
Profluorid L contains ethyl acetate, sodium fluoride, calcium fluoride, cellulose ester and eugenol. Do not use in case of known allergies to ingredients.
Do not use **Profluorid L** as systemic treatment. Do not use with patients with ulcerative gingivitis or stomatitis.

Method of use:
1. **Preparation**
   Clean and thoroughly air-dry surfaces to be treated.
2. **Dispensing**
   a. Bottle
   Shake **Profluorid L** bottle well before each use. The solid particles must be well-dispersed. The space and two metal balls in the bottle facilitate homogeneous resuspension.
   Dispense a few drops of **Profluorid L** into the disposable dish. Tightly close **Profluorid L** bottle after use.
   b. SingleDose
   Remove a **SingleDose** application on the perforation and turn the printed side up. Pierce the foil with a **Single Tim**, enlarge the opening and wet the brush with circling movements.
3. **Application**
   Thinly coat the surfaces. Caution: Layers that are too thick may easily peel. Allow the varnish to be absorbed for 10 – 20 s, then dry with air. **Profluorid L** remains on the applied surfaces for several days if correctly applied and appropriate oral hygiene (**teeth should not be brushed for 12 – 24 h after application**) is carried out.
   For hypersensitive cervical areas, crown margins or similar indications, repeat treatment two to three times at intervals of 7 days, if indicated. Dry the surfaces only and reapply.

Additional information:
1gm **Profluorid L** contains:
50mg sodium fluoride (equals 23 mg fluoride)

Warning:
Profluorid L should only be used with extreme caution in individuals who may not have control over their swallowing reflex (e.g. pre-school children and the disabled). Systemic fluoride therapy (e.g. fluoride tables or fluoridated table salt) should be discontinued for several days following application of **Profluorid L**.
Incorrect application (see section entitled “Method of use”) can result in larger amounts of fluoride being introduced into the oral cavity than intended. Swallowing such an amount can lead to nausea, vomiting and/or diarrhoea. Routinely exceeding a total daily amount of 2 mg of fluoride (systemic and local) during odontogenesis can result in disturbances in the mineralization of enamel. This disturbance, also referred to dental fluorosis, is manifested as mottled teeth.

Storage information:
Protect **Profluorid L** from direct sunlight and store at room temperature 39°F - 73°F (4°C - 23°C). Do not use after the expiry date printed on the package or bottle.

PRODUCT ORDERING INFORMATION:

50 SingleDose, accessories	REF 1590
200 SingleDose, accessories	REF 1591
pack 1 -4gm bottle, easy brushes, accessories	REF 1592

This material has been developed solely for use in dentistry. Processing should be done strictly according to the instructions for use. VOCO recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. VOCO does not accept liability for any damage or loss, directly or indirectly, stemming from the use of or inability to use the products described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connection therewith.
Descriptions and data constitute no warranty of attributes and are not binding.

CAUTION: U.S. Federal Laws restrict this device to sale by or on the order of a dentist.

No person is authorized to provide any information which deviates from the information provided in the instructions for use.

For questions or comments, please call 1-888-658-2584.

Keep this material out of reach of children.
For dental use only.

An explanation of the symbols used in labeling can be found at
www.voco.dental/symbols

Manufactured by:

VOCO GmbH **Phone +49 (4721) 719-0**
Anton-Flettner-Str. 1-3 **Fax +49 (4721) 719-140**
27472 Cuxhaven **e-mail: marketing@voco.com**
Germany **www.voco.dental**

 © by VOCO

VOCO Profluorid L

USA | ES **Instrucciones de uso**

Leer esmeradamente las instrucciones antes del uso

Laca con flúor para el tratamiento de hipersensibilidad

Profluorid L es una suspensión dental que seca rápido y que adhiere bien al esmalte dental seco y a la dentina. Así es posible conseguir un sellado impermeable de los túbulos dentinarios por un largo periodo de tiempo. **Profluorid L** forma una película protectora aislante e impermeable contra estímulos térmicos y químicos.

Ámbitos de aplicación/indicaciones:
- Tratamiento de la hipersensibilidad
- Sellado de los túbulos dentinarios para preparaciones de cavidad o en superficies radiculares sensibles
- Relleno de base de cavidad debajo de restauraciones de amalgama
- Desensibilizante antes y después del blanqueamiento

Contraindicaciones:
Profluorid L contiene acetato etílico, fluoruro sódico, fluoruro de calcio, éster celulósica y eugenol. No usar en caso de alergias conocidas a estes ingredientes. No usar **Profluorid L** como tratamiento sistemático. No usar en pacientes con gingivitis ulcerosa o estomatitis.

Método de uso:
1. **Preparación**
   Limpiar las superficies a tratar y secar completamente con aire.
2. **Toma**
   a. Frasco
   Agitar el frasco **Profluorid L** antes de cada uso. Las partículas fijas tienen que dispersarse bien. El espacio existente en el frasco y dos bolas metálicas facilitan el agitamiento. Aplicar una cuantas gotas de **Profluorid L** en la fuente desechable. Cerrar bien el frasco **Profluorid L** después del uso.
   b. SingleDose
   Separar la perforación en el **SingleDose** y girar la parte estampada para arriba. Penetrar el plástico con **Single Tim**, ensanchar el agujero y humedecer el cepillito con el líquido haciendo movimientos giratorios.
3. **Aplicación**
   Aplicar **finamente** en las superficies. Atención: Capas muy gordas se desprenden fácilmente. Dejar penetrar la laca fluorada unos 10 a 20 s y luego secar con aire.
   Si se utiliza debidamente el producto y si se procede a una higiene bucal adecuada (**no cepillar los dientes durante 12 a 24 h después de la aplicación**), **Profluorid L** permanecerá varios días en las superficies tratadas.
   En caso de los cuellos de los dientes hipersensibles, bordes de coronas o indicaciones parecidas, se debe repetir el tratamiento dos a tres veces con intervalos de 7 días. Unicamente proceder a secar las superficies, aplicando de nuevo el producto.

Información adicional:
1grs de **Profluorid L** contiene:
50mgrs de fluoruro sódico (corresponde a 23 mgrs. de fluoruro).

Atención:
En personas en las que no esté garantizado el control sobre el reflejo de trago (p. ej. niños preescolares, minusválidos), tiene que ser utilizado **Profluorid L** con especial atención. En caso de una terapia de flúor sistémica (p. ej. por comprimidos de fluoruro o sal fluorizado), se debería interrumpir éste por unos días después de la aplicación de **Profluorid L**. En caso de una aplicación errónea (véase párrafo “método de uso”) pueden ir cantidades más grandes de fluoruro a la cavidad bucal. El tragar de semejante cantidad puede resultar en náuseas, vómitos y diarreas. Al exceder periodicamente la toma de fluoruro total diaria (sistemática o local) de 2 mgrs. durante el desarrollo del diente pueden resultar perturbaciones de la mineralización del esmalte dental. Esta perturbación, también llamada fluorosis dental muestra los dientes con manchas.

Conservación:
Proteger **Profluorid L** de la luz directa del sol a una temperatura entre 39°F - 73°F (4°C - 23°C). ¡No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase respectivamente frasco!

Presentaciones:

50 SingleDose, accesorios	REF 1590
200 SingleDose, accesorios	REF 1591
envase 1 frasco de 4grs, easy brushes, accesorios	REF 1592

Este material se desarrolló exclusivamente para el uso del odontólogo. El proceso debe ser como está indicado en la información de uso. VOCO reconoce su responsibilidad de reemplazar los productos si se muestran que están defectos. VOCO no acepta la responsabilidad de cualquier perjuicio o pérdida que descienden del uso o de la incapacidad de usar los productos descritos. Antes de usarlo, es la responsabilidad del utilizador de determinar lo adecuado del producto para su uso intentado. El utilizador supone todo el riesgo y la responsabilidad en conexión con eso. Descripciones y datos no constituyen ninguna garantía y no son aglumerantes.

ATENCIÓN: La legislación americana registre este dispositivo para venderlo o al pedido del dentista.

Ninguna persona está autorizada de proveer ninguna información que desvía de las informaciones provéidas en estas instrucciones de uso.

Para preguntas o comentarios, por favor, llámen al 1-888-658-2584.

Mántengase fuera del alcance de los niños.
Solamente para el uso odontológico.

La explicación de los símbolos usados en el etiquetado puede ser encontrada en:
www.voco.dental/symbols

Fabricado por:

VOCO GmbH **Phone +49 (4721) 719-0**
Anton-Flettner-Str. 1-3 **Fax +49 (4721) 719-140**
27472 Cuxhaven **e-mail: marketing@voco.com**
Germany **www.voco.dental**